


• IMPACT OU SUSPICION D'IMPACT OCULAIRE

Certains signes cliniques peuvent faire évoquer un impact oculaire par un laser : une douleur oculaire, une sensation de sable dans les yeux, un trouble visuel, un éblouissement fugace...




© Adobe stock 189296027

Les premières mesures à mettre en œuvre :



- Arrêter l'installation laser.



- Mettre la personne en position allongée afin d'éviter tout risque de saignement, d'hémorragie rétinienne ou intra oculaire.
- Protéger l'oeil par une compresse stérile ou un pansement propre.




- Prévenir les secours (15 ou 112) : un avis médical ophtalmologique urgent est indispensable.

• BRÛLURE CUTANÉE



- Arrêter l'installation laser.



- Rincer la brûlure avec de l'eau courante tempérée pendant au minimum 10 minutes.
- Recouvrir la brûlure d'une compresse stérile ou d'un pansement propre.



- Prévenir les secours (15 ou 112) qui jugeront de la nécessité d'un transport vers un service d'urgence.

Dans tous les cas

Dans l'attente des secours, recueillir les informations utiles, *a minima* :

- L'heure de l'accident.
- Le type de laser et la puissance au moment de l'impact.



- Si besoin, recouvrir la victime d'une couverture de survie pour éviter l'hypothermie.
- Prévenir le médecin de prévention.
- Informer le référent sécurité laser et/ou l'assistant de prévention.



- Réaliser une déclaration d'accident de travail.